

Soins à donner à un noyé

Extrait du livret de Sociétaire / Statuts et règlements de la SISL en 1950

- 1° Transportez-le dans un endroit aéré.
- 2° Inclinez la tête en bas et de côté, pour faciliter la sortie de l'eau et des mucosités qui encombrant la gorge et la bouche.
- 3° Desserrez ses vêtements et frottez-le vigoureusement avec des linges secs et chauds si possible, sinon avec ses propres vêtements, ou avec les mains, un essuie-main ou une brosse.
- 4° Ouvrez-lui la bouche en desserrant les dents avec un coin de bois ou une canne, saisissez la langue avec un linge et tirez-la dehors, puis faites-la rentrer dans la bouche alternativement 15 à 20 fois par minute (système du D^r Laborde); il est **important** de faire en même temps la **respiration artificielle**. - Ne roulez pas le noyé sur un tonneau, ne le suspendez pas par les pieds, **mais il est bon de placer le corps dans une position telle que la tête et la poitrine soient plus bas que le reste du corps.**

Pour la **respiration artificielle**, on se met à genoux à côté du patient, on applique les mains de chaque côté de la poitrine, que l'on comprime fortement au moment où la langue est tirée dehors, puis l'on cesse la compression avec les mains pour laisser rentrer l'air au moment où la langue, tenue par une autre personne, est repoussée dans la bouche, 15 à 20 fois par minute. Quand on est seul, on se place à genoux, derrière la tête du patient, on saisit les bras en avant des coudes (entre le coude et le poignet), on les tire ensemble en arrière par dessus la tête et on les ramène en position en comprimant fortement la poitrine de chaque côté. On répète ce mouvement 15 à 20 fois par minute.

IMPORTANT. — Il faut de temps en temps faire trépidier le cœur, ce qui se fait en appliquant la main sur la région du cœur et en poussant brusquement la paroi thoracique, 130 à 150 fois dans une minute, sans frotter.

BOITE DE PHARMACIE

COMPOSITION

I. Pièces de pansement.

- 2 triangles moyens.
- 2 grands triangles.
- 2 petites bandes.
- 2 bandes moyennes.
- 2 grandes bandes.
- 2 gants de crin pour frictions.
- 1 paquet de ouate antiseptique.
- 1 rouleau de sparadrap.
- 1 essuie-main.

II. Boîte de fer blanc contenant :

- Aiguilles.
- Fil.
- Epingles de sûreté.
- Ficelle.
- Ciseaux.

III. Médicaments.

- 1 paquet ouate perchlorure de fer (hémorragie).
- 1 flacon Lysol (désinfectant).
- 1 » Gouttes d'Hoffmann.
- 1 » Ammoniaque pure (excitant).
- 1 » » anisée.
- 1 » Acétate de plomb (contusions).
- 1 » Alcool de moutarde (frictions comme révulsifs).
- Liniment oléocalcaire (utile en massant).
- 6 cartouches antiseptiques.
- 6 feuilles papier moutarde (sinapismes).

BOITE DE PHARMACIE

INSTRUCTIONS

OUATE PERCHLORURE DE FER. — Pour hémorragie. A placer sur la plaie en comprimant.

LYSOL. — Solution à 2 %, dans de l'eau pure, pour plaies, coupures, etc. — Pour doser la solution, il suffit de verser le lysol goutte à goutte dans un demi-verre d'eau jusqu'à ce que l'eau prenne une teinte savonneuse jaunâtre. Pour les piqûres, une seule goutte de lysol pur suffit.

GOUTTES D'HOFFMANN. — 15 à 20 gouttes dans un demi-verre d'eau, à prendre en cas d'indisposition, d'indigestion, malaise.

AMMONIAQUE ANISÉE. — 15 à 30 gouttes dans un demi-verre d'eau, à prendre en cas de nausée, indigestion, angoisse, ivresse.

AMMONIAQUE PURE. — Pour respirer. Excitant.

SINAPISMES. — Les tremper dans l'eau froide, les appliquer aux cuisses en cas d'apoplexie; sur la région du cœur en cas de syncope, évanouissement.

GANTS DE FRICTIONS. — Destinés à frotter les membres d'un noyé et ramener la circulation.
